

短 報

オオゴキブリの記録

根来 尚

富山市科学文化センター

オオゴキブリ *Panesthia spadica* SHIRAKI は、青森県から鹿児島県まで分布し、本州の日本海側では、青森・山形・新潟・石川・福井・京都・兵庫・鳥取・島根の各県から記録がある(日浦, 1975; 山崎, 1982)。

富山県からはたいへん古い記録が1例あるのみである(坂井, 1908)。

筆者は、本種を富山県下で採集したので、以下に記録しておきたい。

2♂♂2幼虫 富山県高岡市伏木勝興寺境内 14-XI-1984 (根来 尚・太田道人採集・科学文化センター所蔵 TOYA-JI-4361~4364) (図1)

富山県産ゴキブリ類は、標本の現存する確実なものとして筆者が確認し得たところでは、クロゴキブリ・ヤマトゴキブリ・チャバネゴキブリ・モリチャバネゴキブリの4種があり(瀬川, 1979; 根来, 1982), 今回のオオゴキブリとあわせて3科5種が存在することとなる。




図1 オオゴキブリ2♂♂2幼虫

採集をともにされた太田道人氏に感謝する。

文 献

- 日浦 勇, 1975. 1センチ以上の昆虫誌 2. ゴキブリ(2). Nature Study(大阪自然史博物館友の会会誌), 21(5): 2-6.
- 根来 尚, 1982. 富山市産昆虫類の記録. 富山市科学文化センター研究報告, 4: 31-67.
- 坂井憲三, 1908. 富山県産昆虫分類目録. 教育大会記録参考部(富山県教育会編): 104-114.
- 瀬川哲夫, 1979. 直翅目. 富山県の昆虫, 富山県: 64-74.
- 山崎柄根, 1982. 網翅目. 日本の重要な昆虫類の分布(全国版), 環境庁: 66-67.